

	A	B	C	D
1	<b>19 сигнальных (индикативных) показателей на 2017 год</b>			
2				
3	№ п/п	Ключевые (сигнальные) индикаторы	Краткое наименование формы для расчёта показателей*	Рекомендуемые значения
4	1	Доля больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболитис (на догоспитальном и госпитальном этапах)	ИБС	не менее 25%
5	2	Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	ИБС	не менее 30-35%
6	3	Доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах субъекта от общего количества выбывших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом	ЦВБ	менее 20%
7	4	Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением	ЦВБ	не менее 35%
8	5	Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания	ЦВБ	не менее 40%
9	6	Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболитис	ЦВБ	не менее 5 %
10	7	Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации	ИБС	менее 25 %
11	8	Доля населения субъекта Российской Федерации вакцинированного против гриппа	Дыхание	30 % (на конец 2017 года)
12	9	Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированных во все стационары субъекта РФ	ДТП	не менее 82 %
13	10	Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)	ОНКО	не менее 55,5 %
14	11	Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных с ЗНО	ОНКО	не менее 90 %
15	12	Доля тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской помощи	ЦВБ	не менее 75 %
16	13	Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 2016 г.)	ТУБ	не менее 60 %
17	14	Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения	ТУБ	не менее 95 %
18	15	Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	ТУБ	не менее 95%
19	16	Доля больных с ЗНО, выявленных активно	ОНКО	не менее 23,5%
20	17	Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа с впервые в жизни установленным диагнозом болезней печени и поджелудочной железы	Пищеварение	не менее 70 %
21	18	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	ДТП	не менее 95 %
22	19	Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	Дыхание	не менее 85 %